


۱- برای تابع  $f$  در شکل روبرو داریم:  $f'(4) = 1/5$  و  $f(4) = 25$  با توجه به شکل مختصات نقاط  $A$ ,  $B$  و  $C$  را باید.



«پاسخ»

$$m = \frac{f(B) - f(A)}{x_B - x_A} = \frac{f(C) - f(A)}{x_C - x_A} = f'(A) \Rightarrow \frac{f(B) - 25}{5 - 4} = \frac{f(C) - 25}{3 - 4} = 1/5$$

$$\begin{cases} \frac{f(B) - 25}{1} = 1/5 \Rightarrow f(B) = 26/5 \\ \frac{f(C) - 25}{3 - 4} = 1/5 \Rightarrow f(C) = 23/5 \end{cases} \Rightarrow B\Big|_{26/5}, A\Big|_{25}, C\Big|_{23/5}$$

۲- اگر  $f'(x) = x^3 - 2$  را به دست آورید.


«پاسخ»

$$f(-1) = (-1)^3 - 2 = -1 - 2 = -3$$

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2 + 3}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 1) = 3 \end{aligned}$$

۳- با درنظر گرفتن نمودار  $f$  در شکل، نقاط به طول‌های  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  و  $e$  را با مشتق‌های داده شده در جدول نظیر کنید.

$x$	$f'(x)$
	۰
	$-0/5$
	۲
	$-2/5$
	-۲



» پاسخ «

$x$	$f'(x)$
$d$	۰
$b$	$0/5$
$c$	۲
$a$	$-0/5$
$e$	-۲

۴- اگر  $f'(2) = ۰$  و معادله خط مماس بر منحنی  $f$  را در نقطه‌ای به طول ۲ واقع بر آن بنویسید.

» پاسخ «

$$f(2) = 3(2)^3 - 2(2) + 1 = ۹$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^3 - 2x + 1 - 9}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^3 - 2x - 8}{x - 2} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x \rightarrow 2}} \frac{(x-2)(3x^2+4x+4)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 4x + 4) = 10 \end{aligned}$$

$$y - 9 = 10(x - 2) \Rightarrow y = 10x - 11 \quad \text{معادله خط مماس}$$

۵- تابع  $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & x < 0 \\ 2 & x = 0 \\ 2x + 1 & x > 0 \end{cases}$  را در نظر بگیرید.

الف) نشان دهید  $(f')$  وجود ندارد.


ب) ضابطهٔ تابع مشتق را بنویسید.

ج) نمودار تابع  $f'$  را رسم کنید.


## » پاسخ «

الف) در  $x = 0$  گوش‌های و مشتق ناپذیر است. (در صورتی که با مقدار مشتق چپ و راست بررسی کند نمره تعلق می‌گیرد)

۰/۵       $f'(x) = \begin{cases} 2 & x < 0 \\ 2x & x > 0 \end{cases}$



۶- برای تابع  $f$  در شکل زیر،  $0/5 = f'(3)$  و  $5 = f(3)$  باشد. با توجه به شکل مختصات نقاط  $B$  و  $C$  را بیابید.



## » پاسخ «

$$A \left| \begin{array}{l} 3 \\ 5 \end{array} \right., m = 0/5$$

$$y - y_A = m(x - x_A) \Rightarrow y - 5 = 0/5(x - 3) \Rightarrow y = 0/5x + 3/5$$

$$C \left| \begin{array}{l} 2 \\ 0/5(2) + 3/5 \end{array} \right. \Rightarrow C \left| \begin{array}{l} 2 \\ 4/5 \end{array} \right.$$

$$B \left| \begin{array}{l} 2 \\ 0/5(4) + 3/5 \end{array} \right. \Rightarrow B \left| \begin{array}{l} 2 \\ 5/5 \end{array} \right.$$

۷- اگر  $f(x) = 1 - 2x^2$  باشد،  $f'(1)$  را با استفاده از تعریف مشتق به دست آورید.

**پاسخ »**

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - 2x^2 + 1}{x + 1} \quad (0/25) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(1 - x)(1 + x)}{x + 1} = 4 \quad (0/25) \end{aligned}$$

۸- با استفاده از تعریف، معادله خط مماس بر نمودار تابع  $f(x) = x^2 + 2x + 3$  را در نقطه  $x = 1$  به دست آورید.

**پاسخ »**

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \quad (0/25) = \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} \quad (0/25) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 3)}{(x - 1)} \quad (0/25) = 4 \quad (0/25) \\ y - 5 &= 4(x - 1) \Rightarrow (0/5) \quad y = 4x + 2 \end{aligned}$$

۹- با استفاده از تعریف، مشتق تابع  $f(x) = x^2 + 1$  را در نقطه  $a$  محاسبه کنید.

**پاسخ »**

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + 1 - (a^2 + 1)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a} = 2a \quad (0/5)$$

$\underbrace{\phantom{0/25}}_{0/25}$ 
 $\underbrace{\phantom{0/25}}_{0/25}$ 
 $\underbrace{\phantom{0/5}}_{0/5}$

۱۰- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع  $y = \sqrt{4 - x}$  را به دست آورید.

**پاسخ »**

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 - x - \Delta x} - \sqrt{4 - x}}{\Delta x} \times \frac{\sqrt{4 - x - \Delta x} + \sqrt{4 - x}}{\sqrt{4 - x - \Delta x} + \sqrt{4 - x}} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 - x - \Delta x - 4 + x}{\Delta x (\sqrt{4 - x - \Delta x} + \sqrt{4 - x})} = \frac{-1}{2\sqrt{4 - x}} \end{aligned}$$

۱۱- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق پذیری تابع  $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$  در  $x = 0$  بررسی نمایید.

**پاسخ »**

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow f'(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{f(x) - f(\cdot)}{x - \cdot} \quad (0/25)$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} \times \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \quad (0/25) \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f'_+(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot^+} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = +\infty \quad (0/25) \\ f'_-(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot^-} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = -\infty \quad (0/25) \end{array} \right. \\ &\text{پس تابع } f \text{ در } x = 0 \text{ مشتق پذیر نمیباشد.} \quad (0/25) \end{aligned}$$

۱۲- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع  $f(x) = \frac{2}{x}$  را در  $x = 3$  حساب کنید.


**پاسخ »**

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (0/25) \rightarrow$$

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{2}{x} - \frac{2}{3}}{x - 3} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{6 - 2x}{3x}}{x - 3} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{6 - 2x}{3x(x - 3)} \quad (0/25) = -\frac{2}{9} \quad (0/25)$$

۱۳- خط مماس بر نمودار  $f$  را در نقطه‌ی  $(2, 9)$  رسم کنید.

» پاسخ «



۱۴- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع  $f(x) = \frac{1}{x+1}$  را در  $x=2$  حساب کنید.

» پاسخ «

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}}{x - 2} =$$

(۰/۲۵)

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{3-(x+1)}{3(x+1)}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{-x+2}{3(x+1)}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{3(x+1)} = \frac{-1}{9}$$

(۰/۲۵)

۱۵- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  را در نقطه‌ی  $x=2$  بدست آورید.


» پاسخ «

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = f'(2) \quad (0/25) \quad \Rightarrow \quad f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4 \quad (0/5)$$

۱۶- اگر  $f(x) = x \left( \sqrt[3]{x^2} + 1 \right)$  آنگاه مقدار  $f'(0)$  را با تعریف مشتق به دست آورید.

» پاسخ «

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sqrt[3]{x^2} + 1 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \sqrt[3]{x^2} + 1 \right) = 1$$




- ۱۷- شیب تقریبی خط مماس بر نمودار در تعدادی نقطه در جدول زیر داده شده است. آن نقطه‌ها را تعیین کنید.

شیب	-۲	-۱	۰	$\frac{1}{2}$	۱	۳
نقطه						

» پاسخ «

شیب	-۲	-۱	۰	$\frac{1}{2}$	۱	۳
نقطه	C F E B D A					



- ۱۸- برای تابع  $f$  در شکل روبرو داریم  $f'(4) = \frac{1}{5}$  و  $f(4) = 24$  با توجه به شکل، مختصات نقاط A، B و C را بیابید.

» پاسخ «

$$f'(4) = m_{AB} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{y_B - 24}{1} \Rightarrow y_B = 25/5$$

$$\frac{y_C - 24}{-1} = 1/5 \Rightarrow y_C = 22/5$$

$$A \left| \begin{matrix} 4 \\ 24 \end{matrix} \right. \left( \frac{0}{25} \right) \quad B \left| \begin{matrix} 5 \\ 25/5 \end{matrix} \right. \left( \frac{0}{25} \right) \quad C \left| \begin{matrix} 3 \\ 22/5 \end{matrix} \right. \left( \frac{0}{25} \right)$$

۱۹- مشتق توابع داده شده را به دست آورید.

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{-3x + 2} \quad (ب)$$

$$f(x) = (3x^2 - 4)(2x - 5)^2 \quad (\text{الف})$$

$$f(x) = \frac{9x - 2}{\sqrt{x}} \quad (ت)$$

$$f(x) = (\sqrt{3x+2})(x^2 + 1) \quad (پ)$$

**پاسخ »**



(الف)  $f'(x) = 8x(2x - 5)^2 + 4(2x - 5)(3x^2 - 4) = (2x - 5)(24x^2 - 20x - 16)$

(ب)  $f'(x) = \frac{(2x - 3)(-3x + 2) + 3(x^2 - 3x + 1)}{(-3x + 2)^2} = \frac{-3x^2 + 4x - 3}{(-3x + 2)^2}$



(پ)  $f'(x) = \left(\frac{3}{\sqrt{3x+2}}\right)(x^2 + 1) + 3x^2(\sqrt{3x+2})$


(ت)  $f'(x) = \frac{9(\sqrt{x}) - \frac{1}{2\sqrt{x}(9x-2)}}{(\sqrt{x})^2}$

۲۰- نمودار توابع  $f$  و  $g$  و  $h$  و  $t$  را به نمودار مشتق آنها، نظیر کنید.



**پاسخ \***





۲۱- الف) با استفاده از نمودار تابع  $f(x) = x^2 + 2x + 3$  (شکل مقابل) مقادیر زیر را به ترتیب صعودی مرتب کنید.

$$f'(2), f'(-1), f'(0), f'(3)$$

ب) صحت ادعای خود در (الف) را با محاسبه مشتق تابع

$$f(x) = x^2 + 2x + 3$$

پ) تابع مشتق را رسم کنید.


» پاسخ «

الف  $f'(-1) < f'(0) < f'(2) < f'(3)$

ب)  $f'(x) = 2x + 2$


$$f'(3) = 8, f'(2) = 6, f'(0) = 2, f'(-1) = -2$$

$$f'(3) > f'(2) < f'(0) > f'(-1)$$




پ) تابع مشتق:


۲۲- با محاسبه مشتق راست و مشتق چپ توابع داده شده در نقطه A، نشان دهید که این توابع در نقطه A مشتق پذیر نیستند.



(الف)



(ب)



(ج)

**پاسخ**

$$(الف) f'_+(0) = \cdot \quad \text{وجود ندارد} \\ f'_-(0) = -1 \Rightarrow f'(0) \text{ نیست}$$

$$(ب) f'_+(1) = -1 \quad \text{وجود ندارد} \\ f'_-(1) = \cdot$$

$$(ج) f'_+(4) = \frac{1}{2} \quad \text{وجود ندارد} \\ f'_-(4) = \frac{1}{4}$$

۲۳- مشتق تابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)

$$g(x) = x^2 (\sqrt{x+1}) \quad (ب)$$

$$f(x) = \left(\frac{x}{2x-1}\right)^5 \quad (الف)$$

**پاسخ**

$$f'(x) = 5\left(\frac{x}{2x-1}\right)^4 \quad (0/5) \times \left(\frac{2x-1-2x}{(2x-1)^2}\right) \quad (0/5)$$

$$g'(x) = 2x(\sqrt{x+1}) \quad (0/5) + \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \times x^2 \quad (0/5)$$

۲۴- به کمک تعریف مشتق، مشتق پذیری تابع  $f(x) = x|x-1|$  در  $x=1$  بررسی کنید.

**پاسخ**

$$\text{تابع } f \text{ در } x=1 \text{ پیوسته است.} \quad (0/25)$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x|x-1| - 0}{x-1} \quad (0/25) \Rightarrow \begin{cases} f'_+(1) = 1 & (0/25) \\ f'_-(1) = -1 & (0/25) \end{cases}$$

پس تابع f در  $x=1$  مشتق پذیر نیست.  $\quad (0/25)$

۲۵- معادله خط مماس بر نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را در نقطه‌ای به طول  $\frac{1}{2}$  واقع بر منحنی را به دست آورید.

**پاسخ »**

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (0/25) \\ m = f'\left(\frac{1}{2}\right) = -4 \quad (0/25) \\ x_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \quad (0/25) \\ \Rightarrow y = -4x + 4 \quad (0/25) \end{array} \right\} \Rightarrow y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y - 2 = -4\left(x - \frac{1}{2}\right) \quad (0/25)$$

۲۶- فرض کنید  $f(x) = x^6 - 2x^4 - x + 1$  حاصل  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1+h) - f'(1)}{h}$  را به دست آورید.

**پاسخ »**

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^5 - 8x^3 - 1 \quad (0/25) & f''(x) &= 30x^4 - 24x^2 \quad (0/25) \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1+h) - f'(1)}{h} &= f''(1) \quad (0/25) \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1+h) - f'(1)}{h} & &= 30(1)^4 - 24(1)^2 \\ &= 6 \quad (0/25) & & \end{aligned}$$

۲۷- مشتق تابع زیر را بیابید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)

$$f(x) = \frac{3x^3 + 5}{5x - 1}$$

**پاسخ »**

$$f'(x) = \frac{9x^2(5x-1) - 5(3x^3 + 5)}{(5x-1)^2} \quad (0/25) \quad (0/5)$$

۲۸- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق‌پذیری تابع  $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & x \leq 1 \\ x^2+3 & x > 1 \end{cases}$  را در  $x=1$  بررسی کنید.

» پاسخ «

مشتق‌پذیر نیست (۰/۲۵) زیرا

$$f'_+(1) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1^+ \\ (0/25)}} \frac{x-1}{x-1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1^+ \\ (0/25)}} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2 \quad (0/25) \quad , \quad f'_-(1) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ (0/25)}} \frac{3(x-1)}{x-1} = 3 \quad (0/25)$$

۲۹- با استفاده از تعریف مشتق، وجود مشتق‌های راست و چپ و مشتق‌پذیر بودن تابع  $f(x) = |x-3|$  را در نقطه  $x=3$  بررسی کنید.

» پاسخ «

مشتق‌پذیر نیست.

$$f'_+(3) = \lim_{\substack{x \rightarrow 3^+ \\ (0/25)}} \frac{|x-3| - 0}{x-3} = \lim_{\substack{x \rightarrow 3^+ \\ (0/25)}} \frac{x-3}{x-3} = 1 \quad (0/25) \quad , \quad f'_-(3) = \lim_{\substack{x \rightarrow 3^- \\ (0/25)}} \frac{-(x-3)}{x-3} = -1 \quad (0/25)$$

۳۰- معادله‌ی خط قائم بر منحنی تابع  $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$  را در نقطه‌ای به طول  $2 = x$  بیابید.

» پاسخ «

$$f(2) = 4 \quad (0/25) \Rightarrow f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} \quad (0/5) \Rightarrow m_{\text{مماس}} = f'(2) = -3 \quad (0/25) \Rightarrow m_{\text{قائم}} = \frac{1}{3} \quad (0/25)$$

معادله‌ی خط قائم  $y - 4 = \frac{1}{3}(x - 2)$  (۰/۲۵)

۳۱- با استفاده از تعریف مشتق، مشتق‌پذیری تابع  $f(x) = |x^2 - 4|$  را در  $x = 2$  بررسی نماید.

**پاسخ »**

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 - 4| - 0}{x - 2} \quad (0/25)$$

$$\begin{cases} f'_+(2) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x \rightarrow 2^+}} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 4 \quad (0/5) \\ f'_-(2) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2^- \\ x \rightarrow 2^-}} \frac{-(x^2 - 4)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)(x+2)}{x-2} = -4 \quad (0/5) \end{cases}$$

$\circledcirc \circledcirc$

$f'_+(2) \neq f'_-(2)$  پس تابع  $f$  در  $x = 2$  مشتق‌پذیر نمی‌باشد.  $(0/25)$

۳۲- به کمک تعریف، مشتق‌پذیری تابع  $f(x) = |x^2 - 1|$  را در نقطه‌ی  $x = 1$  بررسی کنید.

**پاسخ »**

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} \quad (0/25) = \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 1^+ \\ x \rightarrow 1^+}} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2 \quad (0/25) \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 1^- \\ x \rightarrow 1^-}} \frac{-(x^2 - 1)}{x - 1} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 1^-} -(x+1) = -2 \quad (0/25) \end{cases}$$

چون این حد وجود ندارد بنابراین  $f(x)$  در  $x = 1$  مشتق‌پذیر نیست.  $(0/25)$

۳۳- به کمک تعریف، مشتق‌پذیری تابع  $f(x) = \sqrt{x-2}$  را در نقطه‌ی  $x = 2$  بررسی کنید.

**پاسخ »**

$$D_f = [2, +\infty) \quad (0/25)$$

$$f'_+(2) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2^+ \\ x \rightarrow 2^+}} \frac{\sqrt{x-2} - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{\sqrt{x-2}} = +\infty \quad (0/25) \Rightarrow$$

$\circledcirc \circledcirc \circledcirc$

$f(x)$  تابع در نقطه‌ی  $2$  مشتق‌پذیر نیست.  $(0/25)$

-۳۴- اگر  $f(x) = 2x^4 + 1$  و  $g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 + 3}}$  باشند، مشتق تابع  $fog$  را در  $x=0$  باید.

**پاسخ »**

$$f'(x) = 8x^3 \quad (0/25), \quad g'(x) = \frac{-x}{(x^2 + 3)\sqrt[3]{x^2 + 3}} \quad (0/25), \quad g(\cdot) = \frac{1}{\sqrt[3]{\cdot}} \quad (0/25)$$

$$(fog)'(\cdot) = f'(g(\cdot)) \times g'(\cdot) = 8 \left( \frac{1}{\sqrt[3]{\cdot}} \right)^3 \times \cdot = \cdot \quad (0/25)$$

-۳۵- مشتق پذیری تابع  $f(x)$  را در نقطه  $x=2$  بررسی کنید.

**پاسخ »**

$$f(x) = \begin{cases} -3x^2 + 6x + 2 & x \geq 2 \\ 4\sqrt{x+2} - 3x & x < 2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 2 \text{ پیوسته است.} \rightarrow f$$

$$f'(x) = \begin{cases} -6x + 6 & x > 2 \\ \frac{2}{\sqrt{x+2}} - 3 & x > 2 \end{cases} \quad f'_+(2) = -6 \quad f'_-(2) = -2 \Rightarrow f$$

-۳۶- مشتق تابع  $y = 3(2x - 5)^4 + \sqrt[3]{x}$  را به دست آورید. (ساده کردن الزامی نیست.)

**پاسخ »**

$$y' = 3 \times 4 \times 2 \times (2x - 5)^3 + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \quad (0/5)$$

۳۷- مشتق پذیری تابع  $f(x) = (x - 2)^3$  را در  $x = 2$  بررسی کنید.

**پاسخ »**

تابع در  $x = 2$  مشتق پذیر نیست  $\textcircled{0/25}$ . زیرا

$$f'_{-}(2) = \lim_{x \rightarrow 2^{-}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^{-}} \frac{(x - 2) \times 1 - 0}{x - 2} = 1 \quad \textcircled{0/25}$$

$$\underbrace{x \rightarrow 2^{-}}_{\textcircled{0/25}} \quad \underbrace{x \rightarrow 2^{-}}_{\textcircled{0/25}}$$

$$f'_{+}(2) = \lim_{x \rightarrow 2^{+}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^{+}} \frac{(x - 2) \times 2 - 0}{x - 2} = 2 \quad \textcircled{0/25}$$

$$\underbrace{x \rightarrow 2^{+}}_{\textcircled{0/25}} \quad \underbrace{x \rightarrow 2^{-}}_{\textcircled{0/25}}$$

۳۸- مشتق تابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست).

$$f(x) = (4x-1)^3 (x^3 - x)$$

**پاسخ »**

$$f'(x) = 3(4x-1)^2 (4)(x^3 - x) + (3x^2 - 1)(4x-1)^3$$

۳۹- گنجایش ظرفی ۴۰ لیتر مایع است. در لحظه  $t = 0$  سوراخی در ظرف ایجاد می‌شود. اگر حجم مایع باقیمانده در

$$\text{ظرف پس از } t \text{ ثانیه از رابطه } V = 40 \left( 1 - \frac{t}{100} \right)^2 \text{ به دست آید:}$$

الف) آهنگ تغییر متوسط حجم مایع در بازه زمانی  $[0, 1]$  چه قدر است؟

ب) در چه زمانی، آهنگ تغییر لحظه‌ای حجم برابر آهنگ تغییر متوسط آن در بازه  $[0, 100]$  می‌شود؟

**پاسخ**

$$\text{الف) } v(1) = 40 \left( 1 - \frac{1}{100} \right)^2 = 39/204 \Rightarrow \bar{v} = \frac{39/204 - 40}{1 - 0} = -0/796$$

$$v(0) = 40 \left( 1 - \frac{0}{100} \right)^2 = 40$$

$$\text{ب) } v' = 40 \times 2 \left( 1 - \frac{t}{100} \right) \times \left( -\frac{1}{100} \right) = -0/8 \left( 1 - \frac{t}{100} \right)$$

$$-0/8 \left( 1 - \frac{t}{100} \right) = -0/4 \Rightarrow -0/8 + \frac{0/8t}{100} = -0/4$$

$$v(100) = 40 \left( 1 - \frac{100}{100} \right)^2 = 0 \Rightarrow \bar{v} = \frac{0 - 40}{100 - 0} = -0/4$$

$$v(0) = 40 \left( 1 - \frac{0}{100} \right)^2 = 40$$

$$\frac{8t}{100} = \frac{4}{10} \Rightarrow t = 50 \text{ s}$$

۴۰- یک توده باکتری پس از  $t$  ساعت دارای جرم  $m(t) = \sqrt{t} + 2t^3$  گرم است.

الف) جرم این توده باکتری در بازه زمانی  $4 \leq t \leq 2$  چند گرم افزایش می‌یابد؟

ب) آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه  $t = 3$  چه قدر است؟

**پاسخ**

$$\text{الف) } m(4) = \sqrt{4} + 2 \times 4^3 = 130 \Rightarrow 130 - 17/4 = 112/6$$

$$m(2) = \sqrt{2} + 2 \times 2^3 = 17/4$$

$$\text{ب) } m'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} + 6t^2 \quad f(3) = \frac{1}{2\sqrt{3}} + 6 \times 3^2 = 0/28 + 54 = 54/28$$

۴- معادله حرکت متحرکی به صورت  $f(t) = t^2 - t + 10$  برحسب متر در بازه زمانی  $[0, 5]$  (برحسب ثانیه) داده شده است. در کدام لحظه سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه‌ی زمانی  $[0, 5]$  با هم برابرند؟


» پاسخ «

$$f'(t) = 2t - 1$$

$$f(5) = 25 - 5 + 10 = 30 \quad \text{سرعت لحظه‌ای} \Rightarrow \frac{30 - 10}{5 - 0} = 4$$

$$f(0) = 0 - 0 + 10 = 10$$

$$2t - 1 = 4 \Rightarrow 2t = 5 \Rightarrow t = 2.5 \text{ s} \quad \text{متوسط}$$



۴۲- نمودار روبرو نمایش میزان فروش تعداد نوعی کالا ( $N$ ) پس از صرف  $t$  میلیون تومان هزینه برای تبلیغ است.

الف) آهنگ تغییر  $N$  برحسب  $t$  را وقتی  $t$  از  $0, 1, 2, 3$  و  $4$  تا  $1, 2, 3$  و  $4$  تغییر می‌کند به دست آورید.

ب) به نظر شما چرا آهنگ تغییرات، وقتی که مقادیر  $t$  افزایش می‌یابند، در حال کاهش است؟

» پاسخ «

$$\text{(الف)} \frac{N(1) - N(0)}{1 - 0} = \frac{300 - 0}{1} = 300$$

$$\frac{N(2) - N(1)}{2 - 1} = \frac{480 - 300}{1} = 180$$

$$\frac{N(3) - N(2)}{3 - 2} = \frac{600 - 480}{1} = 120$$

$$\frac{N(4) - N(3)}{4 - 3} = \frac{700 - 600}{1} = 100$$

ب) چون شیب مماس‌ها کم می‌شود. (چون آهنگ لحظه‌ای در حال کاهش است) (تعزیر رو به پایین است)

۴۳- یک توده‌ی باکتری پس از  $t$  ساعت دارای جرم  $x(t) = \sqrt{t} + 2t^3$  گرم است. آهنگ تغییر متوسط جرم این توده در بازه‌ی زمانی  $[3, 4]$  چه قدر است؟

» پاسخ «

آهنگ متوسط

$$\Delta x = \frac{x(4) - x(3)}{4 - 3} \quad (0/25) = \frac{130 - (\sqrt{3} + 54)}{1} \quad (0/5) = 76 - \sqrt{3} \quad (0/25)$$

۴۴- یک توده باکتری پس از  $t$  ساعت دارای جرم  $m(t) = \sqrt{t} + t^2$  گرم است. آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه  $t = 9$  چه قدر است؟

» پاسخ «

$$m'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} + 2t \quad (0/5) \Rightarrow m'(9) = \frac{109}{6} \quad (0/25)$$

۴۵- آهنگ متوسط تغییر تابع  $y = \frac{x}{2} + 1$  را به ازای  $x_1 = 0/2$  و  $x_2 = 2$  به دست آورید.

» پاسخ «

$$\underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{(0/25)} = \underbrace{\frac{f(2/2) - f(2)}{0/2}}_{(0/5)} = \underbrace{\frac{2/1 - 2}{0/2}}_{(0/25)} = \frac{0/1}{0/2} = \frac{1}{2}$$

(صفحه ۱۲۶)

۴۶- اگر  $P(t) = 2000 + 500t^2$  نمایش جمعیت یک نوع باکتری در زمان  $t$  باشد (بر حسب ساعت)،  
الف) آهنگ متوسط افزایش جمعیت را در ۴ ساعت اول پس از زمان  $t_1 = 1$  به دست آورید.

ب) آهنگ لحظه‌ای افزایش جمعیت را در  $t = 2$  به دست آورید.

» پاسخ «

$$\text{الف} \quad \underbrace{\frac{p(5) - p(1)}{4}}_{(0/25)} = \underbrace{\frac{14500 - 2500}{4}}_{(0/25)} = \frac{3000}{(0/25)}$$

$$\text{ب) } p'(t) = 1000t \quad (0/25) \Rightarrow p'(2) = 2000 \quad (0/25)$$

صفحه ۱۳۰

۴۷- تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = -x^3 + 5x$  داده شده است. آهنگ متوسط تغییر این تابع را وقتی متغیر از  $1$  به  $3$  تغییر می‌کند، بدست آورید.

» پاسخ «

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-6 - 4}{2} = -5 \quad (0/25)$$

$$\quad (0/5)$$

۴۸- معادلهی حرکت ذرهای به صورت  $s = t^3 - 4t^2 + 2t + 3$  است. (s برحسب سانتیمتر و t برحسب ثانیه است) شتاب این ذره را به عنوان تابعی از زمان پیدا کنید. پس از گذشت ۳ ثانیه شتاب چه قدر است؟

**پاسخ**

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 3t^2 - 8t + 2 \quad (0/5)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t - 8 \quad (0/5)$$

$$a(3) = 6(3) - 8 = 10 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \quad (0/5)$$

۴۹- در تابع با ضابطهی  $x = f(x) = \sqrt{x}$ , آهنگ متوسط تغییر تابع را وقتی x از ۴ به ۲۵ تغییر می‌کند، به دست آورید.

**پاسخ**

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{5-2}{25-4} = \frac{3}{21} \quad (1)$$

۵۰- معادلهی حرکت یک متحرک به صورت  $f(t) = 5t + 2$  می‌باشد. آهنگ متوسط تغییر این تابع را وقتی متغیر از  $t_1 = 1$  به  $t_2 = 3$  تغییر می‌کند، تعیین کنید.

**پاسخ**

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{f(3) - f(1)}{3-1} = \frac{17-7}{2} = 5$$

۵۱- متحرکی که بر محور X ها در حرکت است، دارای معادلهی  $x = 3t^2 - 4t + 1$  می‌باشد. (t را برحسب ثانیه و x را برحسب سانتیمتر بگیرید).

الف) سرعت متوسط این متحرک را در فاصلهی زمانی  $t_1 = 1$  و  $t_2 = 3$  به دست آورید.

ب) سرعت لحظه‌ای آن را در زمان  $t = 2$  به دست آورید.

**پاسخ**

$$\frac{f(3) - f(1)}{3-1} = \frac{f(3) - f(1)}{2} = \frac{16}{2} = 8 \quad (\text{الف})$$

$$f'(x) = 6t - 4 \quad (0/25) \rightarrow f'(2) = 8 = V(2) \quad (0/25) \quad (\text{ب})$$

۵۲- معادلهی حرکت متحرکی به صورت  $x = t^2 + 5t + 6$  می‌باشد. اولاً: سرعت متوسط این متحرک را در فاصلهی زمانی از لحظه‌ی  $t = 3$  تا  $t = 5$  بدست آورید. ثانیا: آهنگ آنی تغییرات  $x$  را در  $t = 2$  بدست آورید.

**پاسخ**

$$t_2 = 5 \Rightarrow x_2 = 56$$

$$t_1 = 3 \Rightarrow x_1 = 30$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{56 - 30}{5 - 3} = \frac{26}{2} = 13$$

$$x' = 2t - 5 \quad t=2 \rightarrow x'(2) = -1$$

۵۳- توپی را با سرعت اولیه  $20$  متر در ثانیه به طور قائم از زمین به بالا پرتاب می‌کنیم. اگر جهت مثبت، از نقطه پرتاب به طرف بالا باشد، معادلهی حرکت به شکل  $x = -4/9t^2 + 20t$  است. مطلوب است محاسبه:

(الف) سرعت لحظه‌ای توپ در پایان یک ثانیه پس از پرتاب؟

(ب) سرعت متوسط توپ از لحظه پرتاب تا پایان ثانیه دوم ( $t = 0$  تا  $t = 2$ )؟

**پاسخ**

$$V = x' = f'(x) = -9/8t + 20$$

$$f'(1) = -9/8 \times 1 + 20 = 10/2$$

$$\text{سرعت متوسط} = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-4/9 \times 2^2 + 20 \times 2 - 0}{2} = 10/2$$

۵۴- معادلهی حرکت یک متحرک به صورت  $y = x^2 - x + 1$  است. آهنگ آنی تغییرات  $y$  را در  $x = 5$  حساب کنید.

**پاسخ**

$$y = x^2 - x + 1 \rightarrow y' = 2x - 1 \rightarrow y'(5) = 9$$

۵۵- متحرکی بر محور  $X$ ها در حرکت است و دارای معادلهی  $x(t) = t^2 + 4t + 1$  می‌باشد.

اولاً: سرعت متوسط متحرک را در فاصله زمانی  $t_1 = 1$  و  $t_2 = 3$  به دست آورید.

ثانیا: سرعت لحظه‌ای در  $t = 3$  را به دست آورید. (بر حسب ثانیه و  $X$  بر حسب سانتی‌متر)

**پاسخ**

$$x(t) = t^2 + 4t + 1 \rightarrow \begin{cases} x(1) = 6 \\ x(3) = 22 \end{cases}$$

$$\text{سرعت متوسط: } \frac{x(3) - x(1)}{3 - 1} = \frac{22 - 6}{2} = 8$$

$$x'(t) = 2t + 4 \rightarrow x'(3) = 10$$

سرعت لحظه‌ای:

- ۵۶- متحرکی که بر محور  $X$  ها در حرکت است دارای معادله  $x = t^2 - 2t - 1$  است ( $t$  را بر حسب ثانیه و  $x$  را سانتی‌متر بگیرید). سرعت متوسط این متحرک را در فاصله زمانی  $t = 1$  و  $t = 4$  و سرعت لحظه‌ای آن را در زمان‌های  $t = 0$  و  $t = 1$  و  $t = 3$  به دست آورید.

**پاسخ**

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(4) - x(1)}{4 - 1} = \frac{v - (-2)}{3} = 3$$

$$x'_t = v_t = 2t - 2 \Rightarrow v(0) = -2, \quad v(1) = 0, \quad v(3) = 4$$

- ۵۷- اگر  $p(t) = 3000 + 100t^2$  نمایش جمعیت یک نوع باکتری در زمان  $t$  باشد ( $t$  بر حسب ساعت)، آهنگ متوسط افزایش جمعیت را در ۵ ساعت اول پس از زمان  $t = 2$  به دست آورید.

**پاسخ**

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{P(7) - P(2)}{7 - 2} = \frac{3000 + 100(7)^2 - 3000 - 100(2)^2}{5} = \frac{100(49 - 4)}{5} = 20 \times 45 = 900$$

- ۵۸- تابع  $f(x) = x^2 + 6x - 7$  داده شده است.  
آهنگ لحظه‌ای تغییر این تابع را در نقطه  $x = 4$  به دست آورید.

**پاسخ**

$$f'(x) = 2x + 6 \Rightarrow f'(4) = 2(4) + 6 = 14$$

- ۵۹- تابع  $f(x) = x^2 + 6x - 7$  داده شده است.  
آهنگ متوسط تغییر این تابع را وقتی متغیر از  $x_1 = 2$  به  $x_2 = 6$  تغییر کند، تعیین کنید.

**پاسخ**

$$\begin{cases} f(6) = 36 + 36 - 7 = 65 \\ f(2) = 4 + 12 - 7 = 9 \end{cases}$$

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{f(6) - f(2)}{6 - 2} = \frac{65 - 9}{4} = \frac{56}{4} = 14$$

۶۰- توپی را با سرعت اولیه  $78/4$  متر در ثانیه به طور قائم از زمین به بالا پرتاب می‌کنیم. اگر جهت مثبت فاصله از نقطه پرتاب به طرف بالا باشد، مطلوب است محاسبه‌ی (الف) سرعت لحظه‌ای توپ در پایان یک ثانیه (ب) سرعت لحظه‌ای در پایان ۴ ثانیه (ج) مدت زمان لازم برای رسیدن توپ به بالاترین نقطه (د) ارتفاعی که توپ بالا خواهد رفت (ه) مدتی که طول می‌کشد تا توپ به زمین برسد. (و) سرعت لحظه‌ای توپ وقتی که به زمین برسد.

## پاسخ

$$S = \frac{-1}{2}gt^2 + V_0 t \Rightarrow S = -4/9t^2 + 78/4t$$

(الف)  $S'_t = -4/8t + 78/4 \rightarrow S'(1) = -4/8 + 78/4 = 68/6 \frac{m}{s}$

(ب)  $S'(4) = V(4) = -4/8(4) + 78/4 = 39/2 \frac{m}{s}$

(ج)  $V(t) = \cdot \Rightarrow t = \frac{78/4}{4/8} = 8s$

(د)  $S(8) = -4/9 \times 64 + 78/4 \times 8 = 213/6 m$

(ه)  $S = \cdot \Rightarrow t = \frac{78/4}{4/9} = 16s$

(و)  $V(16) = -78/4 \frac{m}{s}$