

۱- کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) ادرار فرد سالم (دارای - فاقد) گلوکز و آمینواسید است.

ب) تجزیه آمینواسیدها (به طور مستقیم - درنهایت) او ره تولید می کند.

پ) غدد نمکی غدد (درونریز - بروونریز) هستند.

## «پاسخ»

پ) بروونریز

ب) درنهایت

الف) فاقد

۲- درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) فشار اسمزی درون رگ اثر منفی بر روی تراوش دارد.

ب) سلول های ریزپرداز در روده همانند لوله پیچ خورده نزدیک از نوع مکعبی یک لایه می باشند.

پ) در عمل تراوش همانند باز جذب و ترشح مواد از منافذ بین یاخته ها عبور می کند.

ت) میزنای و مثانه، بنداره داخلی میزراه، از نوع ماهیچه صاف غیرارادی است.

## «پاسخ»

ت) صحیح

پ) غلط

ب) غلط

الف) صحیح

۳- جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.

الف) در فاصله بین هرم ها انشعاباتی از بخش قشری به نام ..... دیده می شود.

ب) سرخرگ های بین هرمی در بخش قشری منشعب شده و سرانجام ..... را در کپسول بومن می سازد.

## «پاسخ»

ب) کلافک

الف) ستون کلیه

۴- درست یا نادرست بوده عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) در کاهش وزن شدید احتمال بسته شدن میزنای وجود دارد.

ب) سرخرگ آوران در اطراف قوس هنله و کلافک، شبکه مویرگی دور لوله ای را می سازد.

پ) ترشح در جهت باز جذب رخ می دهد و ترشح بیشتر به روش غیرفعال انجام می شود.

ت) در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است.

## «پاسخ»

ت) صحیح

پ) غلط

ب) غلط

الف) صحیح

- ۵- الف) غدد راسترودهای در کدام گروه از ماهی‌ها وجود دارد؟  
ب) دو مثال از ماهی‌های غضروفی ذکر کنید.  
پ) چه موادی از غدد راسترودهای به روده ترشح می‌شود؟

## » پاسخ «

- الف) غضروفی  
ب) کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها  
پ) محلول سدیم کلرید غلیظ

۶- دو طریق دفع یون‌ها در ماهیان دریایی را بیان کنید.

## » پاسخ «

- ۱- دفع از طریق آبشش‌ها  
۲- دفع برخی دیگر توسط کلیه‌ها به صورت ادرار غلیظ

۷- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

- الف) سلول‌های دیواره بیرونی کپسول بومن (برخلاف - همانند) مویرگ‌های خونی از نوع سنگفرشی یکلايه است.  
ب) بنداره خارجی میزراه (همانند - برخلاف) بنداره داخلی فاقد کنترل (غیرارادی - ارادی) در نوزادان است.

## » پاسخ «

- الف) همانند - ارادی  
ب) همانند

۸- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

- الف) لوله پیچ‌خورده نزدیک (همانند - برخلاف) لوله پیچ‌خورده دور (دارای - فاقد) ارتباط فیزیکی با لوله جمع‌کننده است.

- ب) ترشح (برخلاف - همانند) تراوش باعث خروج مواد از خون به سمت نفرون می‌شود.  
پ) ماهیان آب شیرین (برخلاف - همانند) ماهیان آب شور، معمولاً آب زیاد نمی‌شوند.  
ت) سرخرگ آوران (برخلاف - همانند) سرخرگ واپران (فاقد - دارای) قطر بیشتری است.

## » پاسخ «

- الف) برخلاف - فاقد  
ب) همانند  
پ) برخلاف - دارای  
ت) برخلاف - دارای

۹- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

- الف) لوله هنله (برخلاف - همانند) لوله خمیده نزدیک (فاقد - دارای) بخش‌هایی در بخش مرکزی کلیه است.  
ب) هر هرم کلیه (برخلاف - همانند) هر لوب کلیه (فاقد - دارای) بخش قشری کلیه است.

## » پاسخ «

- الف) برخلاف - دارای  
ب) برخلاف - فاقد

- ۱۰- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
- الف) ماهیان آب شیرین (هیچگاه - معمولاً) آب زیادی نمی‌نوشند.
- ب) در ماهیان دریایی (برخی - بسیاری) از یون‌ها از طریق یاخته‌های آبیششی و (برخی - بسیاری) توسط کلیه‌ها به صورت ادرار غلیظ دفع می‌شوند.
- پ) (برخی - بسیاری) از خزندگان و پرنده‌ای و بیابانی دارای غدد نمکی هستند.
- ت) کلیه راست (برخلاف - همانند) کلیه چپ (فاقد - دارای) اندازه بزرگ‌تری است.

## » پاسخ «

- الف) معمولاً  
ب) برخی - برشی  
پ) برخی - برشی  
ت) برخلاف - دارای

۱۱- هریک از ویژگی‌های زیر مربوط به کدام گروه از ماهی‌ها است؟

- الف) داشتن غدد راست‌رودهای علاوه بر کلیه:  
ب) فشار اسمزی مایعات بدن بیشتر از محیط:  
پ) فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از محیط:  
ت) دفع برخی یون‌ها از طریق یاخته‌های آبیششی:  
ث) دفع برخی یون‌ها توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ:

## » پاسخ «

- الف) ماهیان غضروفی  
ب) ماهیان آب شور  
پ) ماهیان آب شور  
ت) ماهیان آب شور

۱۲- در ارتباط با ماهیان غضروفی به سوالات زیر پاسخ دهید.

- الف) دو مثال:  
ب) نقش غدد راست‌رودهای در آن‌ها:

## » پاسخ «

- الف) کوسه‌ها و سفرمه‌های ها  
ب) محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ به روده ترشح می‌کند.

۱۳- الف) مثانه دوزیستان در ذخیره آب و یون‌ها چگونه عمل می‌کند؟

- ب) مصرف غذای نمک‌دار در کدام گروه از مهره‌داران صورت می‌گیرد و از چه طریقی نمک اضافه را دفع می‌کنند؟  
چگونه؟

## » پاسخ «

- الف) به هنگام خشک شدن محیط دفع ادرار کم و مثانه بزرگ می‌شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش می‌باید.  
ب) برخی خزندگان و پرنده‌ای و بیابانی - از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به صورت قطره‌های غلیظ-نمک اضافی را دفع می‌کنند.

- ۱۴- در ارتباط با مهره‌داران، جاندارانی که دارای ویژگی‌های زیر هستند مشخص کنید.
- الف) دارای مثانه جهت ذخیره آب و یون‌ها:
  - ب) دارای توانمندی زیاد در جذب آب در کلیه:
  - پ) دارای غدد راست‌رودهای برای دفع سدیم کلرید غلیظ به روده:
  - ت) دارای توانایی برای دفع برخی یون‌ها از طریق یاخته‌های آبششی:
  - ث) بازجذب آب از مثانه به خون:

## » پاسخ «

- ب) خزندگان و پرندگان      پ) ماهیان غضروفی
- ث) دوزیستان                          ت) ماهیان آب شور

- ۱۵- ۴ مورد از ویژگی‌های ماهی‌های آب شور را ذکر کنید.

## » پاسخ «

- ۱- فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از فشار اسمزی محیط است.
- ۲- مقدار زیادی آب می‌نوشند..
- ۳- برخی یون‌ها را به صورت ادرار غلیظ از کلیه دفع می‌کنند.
- ۴- برخی یون‌ها را از طریق یاخته‌های آبششی دفع می‌کنند.

- ۱۶- سه مورد از ویژگی‌های ماهیان آب شیرین را ذکر کنید.

## » پاسخ «

- ۱- فشار اسمزی مایعات بدن از محیط بیشتر است.
- ۲- آب زیادی معمولاً نمی‌نوشند.
- ۳- حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می‌کنند.

- ۱۷- ماهیان آب شور برای مقابله با مشکل پایین بودن فشار اسمزی مایعات بدن نسبت به محیط چه سازگاری‌هایی پیدا کرده‌اند؟

## » پاسخ «

- ماهیان دریایی مقدار زیادی آب می‌نوشند. برخی یون‌ها توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ و برخی از طریق یاخته‌های آبشش دفع می‌شوند.

- ۱۸- ماهیان آب شیرین برای مقابله با مشکل بالا بودن فشار اسمزی مایعات بدن از محیط، چه سازش‌هایی پیدا کرده‌اند؟

## » پاسخ «

- آب زیادی نمی‌شوند و حجم زیادی از آب به صورت ادرار رقیق دفع می‌کنند.

- ۱۹- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  
ماده دفعی حشرات ...<sup>(۱)</sup>... است که همراه با آب به لوله‌های مالپیگی وارد می‌شود و محتوی لوله‌ها به ...<sup>(۲)</sup>... تخلیه می‌شود و با عبور مایعات در ...<sup>(۳)</sup>... آب و یون‌ها ...<sup>(۴)</sup>... می‌شود.

## » پاسخ «

۱ ← اوریک اسید      ۲ ← روده      ۳ ← روده      ۴ ← بازجذب

- ۲۰- الف) سه مورد از انواع ساختارهای دفعی در بی‌مهرگان را ذکر کنید.  
ب) سامانه دفعی متصل به روده چه نام دارد؟

## » پاسخ «

الف) نفریدی - آبشنش - لوله‌های مالپیگی  
ب) لوله‌های مالپیگی

- ۲۱- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  
الف) دنده‌ها (همه - بخشی) از کلیه‌ها را محافظت می‌کنند.  
ب) در (بیشتر - اغلب) موارد، بازجذب فعال است و با صرف انرژی زیستی انجام می‌شود.  
پ) (بیشتر - همه) بی‌مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند.

## » پاسخ «

الف) بخشی      ب) بیشتر      پ) بیشتر

- ۲۲- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  
الف) (ترشح - تراوش) نخستین مرحله تشکیل ادرار است.  
ب) فراوان ترین ماده آلبی در ادرار انسان (آمونیاک - اوره) است.  
پ) هوموستازی از ویژگی‌های اساسی (همه - بیشتر) موجودات زنده است.  
ت) (همه - بسیاری) از بیماری‌ها در نتیجه به هم خوردن هوموستازی پدید می‌آید.

## » پاسخ «

الف) تراوش      ب) اوره      پ) همه      ت) بسیاری

- ۲۳- الف) نفریدی را تعریف کنید.  
ب) نقش نفریدی چیست؟  
پ) جانداران دارای نفریدی کدام‌اند؟

## » پاسخ «

الف) لوله‌ای است که با منفذی به بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می‌شود.  
ب) برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو به کار می‌رود.  
پ) بیشتر بی‌مهرگان

- ۲۴- عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
- الف) در (برخی - بسیاری) از تکیاختهای ها تنظیم اسمزی با کمک (انتشار - انتقال فعال) صورت می‌گیرد.
- ب) در پارامسی، آبی که در نتیجه اسمز وارد می‌شود به همراه مواد دفعی توسط (واکوئل‌های دفعی - واکوئل‌های انقباضی) دفع می‌شود.

## «پاسخ»

- الف) بسیاری - انتشار
- ب) واکوئل‌های انقباضی

- ۲۵- فرآیندهای زیر مربوط به لوله‌های مالپیگی حشرات است. جاهای خالی را کامل کنید.
- ورود اوریکاسید همراه با آب به لوله‌های مالپیگی ← .....(۱)..... جذب آب و یون در روده ← .....(۲).....

## «پاسخ»

- ۱ ← تخلیه محتوی لوله به روده ۲ ← دفع اوریکاسید به همراه مواد دفعی

- ۲۶- الف) نحوه دفع آب و تنظیم اسمزی در پارامسی را بنویسید.
- ب) در بسیاری از تکیاختهای ها تنظیم اسمزی به کمک چه فرآیندی انجام می‌شود؟

## «پاسخ»

- الف) دفع آب به همراه مواد دفعی توسط کریچه انقباضی
- ب) انتشار

- ۲۷- علت و علامت بیماری دیابت بی مزه چیست؟

## «پاسخ»

- علت: عدم ترشح هورمون ضد ادراری و علامت آن: مبتلایان به این بیماری احساس تشنگی می‌کنند و مایعات زیادی می‌نوشند.

- ۲۸- هورمون ضد ادراری چه موقع ترشح می‌شود؟ بر کجا اثر می‌کند؟ و نتیجه اثر آن چیست؟

## «پاسخ»

- موقع تحریک مرکز تشنگی - بر کلیه‌ها - باز جذب آب را افزایش و دفع آن را از ادرار کاهش می‌دهد.

- ۲۹- اگر غلظت مواد حل شده در خوناب زیاد شود:
- (الف) کدام قسمت از مغز تحریک می‌شود؟
  - (ب) نتایج این تحریک چیست؟

## « پاسخ »

- الف) مرکز تشنجی در هیپوتalamوس  
ب) فعال شدن مرکز تشنجی و تمایل به نوشیدن آب و از طرف دیگر ترشح هورمون ضد ادراری

۳۰- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

- الف) بیماری که به علت برهم زدن توازن آب و یونها در بدن، نیازمند توجه جدی است:
- ب) بیماری که باعث التهاب مفاصل در اثر رسوب بلورهای اسیداوریک می‌شود:

## « پاسخ »

- الف) دیابت بی‌مزه  
ب) نقرس

۳۱- الف) نقرس را تعریف کنید.

- ب) منظور از دیابت بی‌مزه چیست؟

## « پاسخ »

- الف) نوعی بیماری مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب آن همراه است.  
ب) اگر به علی هورمون ضد ادراری ترشح نشود، مقدار زیادی ادرار رقیق از بدن دفع می‌شود. چنین حالتی به دیابت بی‌مزه معروف است.

۳۲- الف) دو بیماری ناشی از رسوب بلورهای اوریک و محل آن را ذکر کنید.

- ب) اندامکی که تعداد آن در سلولهای بافت پوششی دیواره لوله پیچ خورده نزدیک زیاد است چیست؟

## « پاسخ »

- الف) سنگ کلیه - نقرس در مفاصل  
ب) راکیزه (میتوکندری)

۳۳- درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.

- الف) کپسول بومن و کلافک در عمل ترشح و بازجذب نقش مستقیمی ندارند.  
ب) حجم ادرار با تراوشن نسبت معکوس دارد.  
پ) در بازجذب، مواد مفید و موردنیاز بدن از لوله پیچ خورده نزدیک و دور و جمع‌کننده ادرار وارد گردش خون عمومی می‌شوند.

## « پاسخ »

- الف) صحیح  
ب) غلط  
پ) صحیح

-۳۴- در تراوش، مواد از چه بخش‌هایی عبور می‌کند؟

## » پاسخ «

۱- منافذ مویرگی کلافک ۲- غشای پایه کلافک ۳- شکاف‌های متعدد پودیست‌های کپسول بومن

-۳۵- سازوکارهایی که با توجه به غلظت مواد حل شده در خون جهت تنظیم آب بدن انجام می‌شود، ذکر کنید.

## » پاسخ «

مرکز تشنجی در هیپوتالاموس تحریک می‌شود و از طرفی هورمون ضد ادراری تولید می‌شود که با اثر بر کلیه بازجذب آب را زیاد و دفع آب را کم می‌کند.

-۳۶- درست یا نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

الف) دریچه واقع در بین میزنای و مثانه در اثر چین خوردنگی مخاط مثانه روی دهانه میزنای به وجود آمده است.

ب) آمونیاک را می‌توان در بدن ذخیره کرد.

پ) آمونیاک فقط در نتیجه تجزیه آمینواسیدها، تولید می‌شود.

## » پاسخ «

پ) صحیح

ب) غلط

الف) صحیح

-۳۷- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) دستگاهی که در حفظ همایستایی نقش اساسی دارد ذکر کنید.

ب) سامانه دفعی متصل به روده در حشرات چیست؟

پ) هورمونی که عدم ترشح آن باعث دیابت بی‌مزه می‌شود چیست؟

## » پاسخ «

الف) دفع ادرار

ب) لوله‌های مالپیگی

پ) هورمون ضد ادراری

-۳۸- الف) دو نوع ماده دفعی نیتروژن دار ذکر کنید.

ب) ماده دفعی که به صورت بلورهای جامد دفع می‌شود، ذکر کنید.

پ) شبکه مویرگی که در داخل کپسول بومن قرار دارد، چه نام دارد.

## » پاسخ «

الف) اوریکا اسید و آمونیاک

ب) اوریکا اسید

پ) گلومرول

-۴۹- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

- الف) ماده نیتروژن داری که تمایل به رسوب و تشکیل بلور زیادی دارد:  
ب) فراوان ترین ماده آلی در ادرار:  
پ) بیشترین ماده تشکیل دهنده ادرار:  
ت) محل تبدیل آمونیاک به اوره:

## «پاسخ»

- الف) اوریکا سید  
ب) اوره  
پ) آب  
ت) کبد

-۴۰- درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

- الف) ویژگی سمی بودن اوره از آمونیاک بسیار کمتر است.  
ب) انباشه شدن آمونیاک در بدن انسان و دفع آن با فواصل زمانی امکان پذیر است.  
پ) اوریکا سید نسبت به آمونیاک انحلال پذیری بیشتری در آب دارد.

## «پاسخ»

- الف) صحیح  
ب) غلط  
پ) غلط

-۴۱- اوره چگونه تشکیل می شود؟ چرا؟

## «پاسخ»

تجمع آمونیاک حاصل از تجزیه آمینواسیدها در خون به سرعت منجر به مرگ می شود. بنابراین در کبد، آمونیاک با کربن دی اکسید ترکیب و به اوره تبدیل می شود.

-۴۲- الف) ترکیبات شیمیایی ادرار را نام ببرید. (۴ مورد)

ب) ماده دفعی حاصل از تجزیه آمینواسیدها چیست؟

## «پاسخ»

- الف) آب - یون ها - اوره - اوریکا سید  
ب) آمونیاک

-۴۳- در ارتباط با ادرار به سوالات زیر پاسخ دهید.

- الف) میزان آب در ادرار؟  
ب) نقش دفع یون ها از طریق ادرار؟  
پ) فراوان ترین ماده دفعی آلی در ادرار؟

## «پاسخ»

- الف) حدود ۹۵ درصد  
ب) به منظور حفظ تعادل یون ها  
پ) اوره

۴۴- موقعیت سرخرگ، سیاهرگ و میزنای را در محل اتصال به کلیه و در نزدیکی مثانه بیان کنید.

## » پاسخ «

در نزدیکی کلیه ← از عقب به جلو شامل سرخرگ - سیاهرگ - میزنای  
در نزدیکی مثانه ← از عقب به جلو شامل سیاهرگ - سرخرگ - میزنای

۴۵- الف) دو فرآیند مؤثر در تعیین ترکیب مایع تراوشی شده به هنگام عبور از گردیزه را ذکر کنید.

ب) تعریف ادرار و منشأ ادرار چیست؟

## » پاسخ «

الف) بازجذب و ترشح

ب) آنچه به لگنچه می‌ریزد ادرار است. منشأ ادرار از خون است.

۴۶- الف) انواع بندارهای موجود در میزراه را از نظر نوع ماهیچه و عملکرد آن‌ها مشخص کنید.

ب) چرا در نوزادان تخلیه مثانه به صورت غیرارادی است؟

## » پاسخ «

الف) بنداره داخلی میزراه ← از نوع ماهیچه صاف و غیرارادی

بنداره خارجی میزراه ← از نوع ماهیچه مخطط و ارادی

ب) چون ارتباط بین مغز و نخاع آن‌ها به طور کامل شکل نگرفته است.

۴۷- الف) مثانه را تعریف کنید.

ب) دلیل فعل شدن سازوکار و تخلیه‌ای ادرار از مثانه

## » پاسخ «

الف) کیسه‌ای ماهیچه‌ای است که ادرار را موقتاً ذخیره می‌کند.

ب) بالا رفتن حجم ادرار مثانه از حد معینی و به دنبال آن کشیدگی دیواره مثانه.

۴۸- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) عامل مؤثر در حرکت ادرار و میزنای:

ب) منشأ دریچه واقع در بین میزنای و مثانه:

پ) نقش دریچه دهانه میزنای:

## » پاسخ «

الف) انقباض ماهیچه‌های صاف دیواره آن و ایجاد حرکت کرمی

ب) دریچه‌ای حاصل از چین خوردگی مخاط مثانه روی دهانه میزنای است.

پ) مانع بازگشت ادرار به میزنای

۴۹- درست یا نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- الف)  $\downarrow \text{PH}$  (یون هیدروژن  $\uparrow$ )  $\leftarrow$  ترشح  $\uparrow \text{H}^+$   
ب)  $\uparrow \text{PH}$  (یون هیدروژن  $\downarrow$ )  $\leftarrow$  ترشح بیکربنات  $\downarrow$

## «پاسخ»

- الف) صحیح      ب) غلط

۵۰- هریک از فرآیندهای زیر در کدام بخش کلیه صورت می‌گیرد؟

- الف) ترشح  
ب) تراوش

## «پاسخ»

- الف) ترشح از مویرگ‌های دورلوله‌ای یا خودیاخته‌های گردیزه (لوله پیچ خورده نزدیک یا دور)  
ب) کپسول بومن

۵۱- درست یا نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- الف) در تراوش هیچ انتخابی وجود ندارد.  
ب) در تراوش هم مواد مفید (گلوکز و آمینواسید) و مواد دفعی مثل اوره به گردیزه وارد می‌شود.  
پ) بازجذب و ترشح فقط در گردیزه صورت می‌گیرد.  
ت) آنچه به لگنچه می‌ریزد ادرار است.

## «پاسخ»

- الف) صحیح      ب) صحیح      پ) غلط      ت) صحیح

۵۲- الف) دو مثال از موادی که به صورت فعال بازجذب می‌شوند نام ببرید.

ب) یک مثال از موادی که غیرفعال بازجذب می‌شوند نام ببرید.

پ) از سه فرآیند مؤثر در تشکیل ادرار کدام یک فعال و کدام غیرفعال است؟

## «پاسخ»

- الف) آمینواسید - گلوکز  
ب) آب

- پ) تراوش (غیرفعال بدون مصرف ATP)  
ترشح و بازجذب در بیشتر موارد با مصرف ATP صورت می‌گیرد.

- ۵۳- الف) فرآیند تراوش در کلیه به کدام شبکه مویرگی انجام می‌شود؟  
ب) فرآیند ترشح در کلیه از کدام شبکه مویرگی صورت می‌گیرد؟  
پ) چند مورد از موادی که ترشح می‌شوند نام ببرید.

## « پاسخ »

- الف) شبکه اول مویرگی  
ب) شبکه دوم مویرگی  
پ) بعضی سموم و داروها - بیکربنات - یون هیدروژن

۵۴- سه نوع سلول پوششی موجود در ساختار نفرون را ذکر کنید.

## « پاسخ »

سنگفرشی ساده - پودسیت - مکعبی ساده

۵۵- الف) ۴ مورد از موادی که کلیه‌ها ترشح می‌کنند، ذکر کنید.

ب) دو نقش فرآیند ترشح در کلیه را بیان کنید.

## « پاسخ »

- الف) یون هیدروژن - بیکربنات - بعضی سموم و داروها  
ب) ترشح در تنظیم میزان PH خون و دفع بعضی سموم و داروها نقش دارد.

۵۶- الف) ترشح از کدام قسمت‌ها در کلیه صورت می‌گیرد؟ و به کجا صورت می‌گیرد؟

ب) ترشح با چه فرآیندی صورت می‌گیرد؟

## « پاسخ »

الف) از مویرگ‌های دورلوله‌ای و یاخته‌های گردیزه - به درون گردیزه

ب) اغلب مواد به روش فعال و با صرف انرژی زیستی

۵۷- عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) در بیشتر موارد بازجذب ..... است و با صرف انرژی صورت می‌گیرد اگرچه بازجذب ممکن است باشد، مثل بازجذب آب که با ..... صورت می‌گیرد.

ب) تراوش مواد براساس اندازه صورت می‌گیرد و هیچ ..... دیگری صورت نمی‌گیرد.

## « پاسخ »

الف) فعال - غیرفعال - اسمز

ب) انتخاب

۵۸- چرا مقدار بازجذب مواد در لوله پیچ خورده نزدیک، بیشتر از سایر قسمت‌ها گردیزه است؟

## » پاسخ «

به علت وجود ریزپرزهای فراوان

۵۹- در ارتباط با بازجذب در کلیه به سوالات زیر پائیخ کوتاه دهید.

الف) محل آغاز بازجذب:

ب) نوع یاخته‌های تشکیل دهنده محل آغاز بازجذب و ویژگی آنها:

## » پاسخ «

الف) لوله پیچ خورده نزدیک

ب) پوشش مکعبی و دارای ریزپرزهای فراوان

۶۰- الف) بازجذب مواد در کلیه توسط کدام مویرگ‌ها صورت می‌گیرد؟

ب) موادی که در جریان تراویش وارد گردیزه می‌شود در حالت کلی چند گروه هستند؟

پ) در تراویش مواد بر چه اساسی و تحت چه نیرویی وارد گردیزه می‌شوند؟

## » پاسخ «

الف) دور لوله‌ای

ب) مواد دفعی مثل اوره - مواد مفید مثل گلوکز و آمینواسید

پ) براساس اندازه - تحت تأثیر نیروی فشار خون

۶۱- در ارتباط با کپسول بومن به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) نوع یاخته‌های دیواره بیرونی و درونی آن:

ب) ویژگی یاخته‌های لایه درونی کپسول بومن:

## » پاسخ «

الف) دیواره بیرونی شامل یاخته‌های پوششی سنگفرشی ساده و دیواره درونی شامل یاخته‌های پودسیت است.

ب) دارای رشته‌های کوتاه و پامانند فراوان. با پاهای خود اطراف مویرگ‌های کلافک را احاطه کرده‌اند و شکاف‌های باریک متعددی در فواصل بین پاهای وجود دارد که امکان نفوذ مواد را به دیواره درونی فراهم می‌کند.

۶۲- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) نوع مویرگ‌های کلافک و نتیجه آن:

ب) سازوکاری که موجب افزایش فشار تراویش در کلافک می‌شود:

## » پاسخ «

الف) منفذدار است. بنابراین امکان خروج مواد از آنها به خوبی فراهم است ولی مولکول‌های بزرگ نمی‌توانند عبور کنند.

ب) زیاد بودن قطر سرخرگ آوران نسبت به وابران

- ۶۳- الف) تراوش از کدام قسمت گردیزه صورت می‌گیرد؟  
ب) دو بخشی که برای تراوش مناسب شده‌اند را ذکر کنید.

## « پاسخ »

- الف) کپسول بومن  
ب) ساختار کلافک و ساختار کپسول بومن

۶۴- کلمه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

- الف) در دو طرف کلافک در انسان (همانند - برخلاف) شبکه مویرگی آبشش‌ها در ماهی، سرخرگ وجود دارد.  
ب) در لوله هنله، بخش قطره پایین‌تر نسبت به بخش قطره بالارو، طول (بیشتر - کمتر) دارد.  
پ) در کلافک ( فقط تراوش - تراوش و بازجذب) و در شبکه دورلوله‌ای (بازجذب و ترشح - فقط ترشح) صورت می‌گیرد.

## « پاسخ »

- الف) همانند  
ب) کمتر  
پ) فقط تراوش - بازجذب و ترشح

۶۵- درست و نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- الف) کلیه به اندازه ۲ مهره، از کل ستون مهره‌ها بالاتر است.  
ب) مسیر ادرار شامل لگنچه ← میزنای ← مثانه ← میزراه است.  
پ) لنف کلیه به بزرگ‌سیاهرگ زیرین و خون کلیه به بزرگ‌سیاهرگ زیرین می‌ریزد.  
ت) در انشعاب سیاهرگ کلیه نسبت به سرخرگ آوران، اکسیژن زیاد و  $\text{CO}_2$  و مواد زائد نیتروژن دار بیشتر است.

## « پاسخ »

- الف) صحیح  
ب) صحیح  
پ) صحیح  
ت) غلط

۶۶- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

- الف) لایه بیرونی کپسول بومن چه نوع بافتی دارد؟  
ب) دیواره درونی کپسول بومن چه نوع سلول‌هایی است؟  
پ) جنس دیواره لوله پیچ‌خورده نزدیک از چه نوع بافتی است؟

## « پاسخ »

- الف) پوششی سنگفرشی ساده  
ب) پودسیت  
پ) پوششی مکعبی

۶۷- درست و نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- الف) شبکه اول مویرگی از هر دو طرف به سرخرگ متصل می‌شود.

ب) شبکه دورلوله‌ای در اطراف لوله پیچ خورده نزدیک و دور لوله جمع‌کننده وجود دارد.

پ) سیاهرگ کلیه مواید زائد کمتری نسبت به سرخرگ دارد.

ت) ادرار نتیجهٔ سه عمل تراوش، بازجذب و ترشح است.

پاں خ

- الف) صحيح      ب) غلط      پ) صحيح      ت) صحيح

۶۸- درست و نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- الف) مجرای جمع کننده ادارار جزء نفرون است.

ب) لوله پیچ خورده دور و نزدیک قطر یکسان دارند.

پ) قسمت قطعی در بخش پایین رو لوله هنله نسبت به بخش بالارو آن طول بیشتری دارد.

ت) هر لوله جمع کننده چند نفرون متصل است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الف) غلط      ب) صحيح      پ) غلط      ت) صحيح

۶۹- درست و نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- الف) تعداد لپ کلیه با تعداد هرم آن برابر است.

ب) عامل اصلی تراوosh در گلومرول، فشار اسمزی سرخرگی است.

پ) بزرگ بودن قطر سرخرگ آوران نسبت به وابران باعث می‌شود همیشه فشار تراووشی نسبت به فشار اسمزی در محدوده گلومرول بالا باشد.

ت) در شبکه اول مویرگی هم تراوosh و ترشح صورت می‌گیرد.

(( پاسخ ))

- الف) صحيح      ب) غلط      ت) غلط      ي) صحيح

۷۰- الف) سه مرحله فرآيند تشکیا، ادرار را ذکر کنید.

- ب) هر یک از فرآیندها را تعریف کنید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الف) تراوش - باز جذب - ترشح

ب) تراوش ← در این مرحله بخشی از خوناب در نتیجه فشار خون از کلافک خارج شده و به کپسول بومن وارد می‌شود.

باز جذب ← فرآیندی است که طی آن مواد مفیدی که تراوش شده بودند، دوباره از طریق مویرگ‌های دورلوله‌ای جذب و به خون وارد می‌شوند.

ترشح ← فرآیندی است طی آن موادی که لازم است دفع شوند از مویرگ‌های دورلوله‌ای یا خود یاخته‌های گردیزه به درون گردیزه وارد می‌شوند.

۷۱- در ارتباط با گردش خون در کلیه طرح زیر را کامل کنید.  
 سرخرگ کلیه ← سرخرگ‌های بین هرمی ← در بخش قشری ایجاد .....(۱)..... کوچکتر ← انشعابات انتهایی  
 سرخرگ ← .....(۲)..... ← کلافک ← .....(۳)..... ← شبکه مویرگی دورلوله‌ای ← .....(۴)..... ←  
 سیاهرگ‌های بین هرمی ← .....(۵).....

## « پاسخ »

- |                  |                 |                     |
|------------------|-----------------|---------------------|
| (۳) سرخرگ وایران | (۲) سرخرگ آوران | (۱) سرخرگ           |
|                  |                 | (۴) سیاهرگ‌های کوچک |
|                  | (۵) سیاهرگ کلیه |                     |

۷۲- انواع شبکه مویرگی کلیه را با ذکر محل آن‌ها بیان کنید.

## « پاسخ »

شبکه مویرگی اول (کلافک - گلومرول) در درون کپسول بومن قرار دارد.  
 شبکه دوم مویرگی (شبکه دورلوله‌ای) که اطراف قسمت‌های دیگر گردیزه قرار دارد.

۷۳- در ارتباط با گردش خون در کلیه به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

- الف) به هر کلیه چند سرخرگ وارد می‌شود؟
- ب) سرخرگی که خون را به کلافک وارد می‌کند؟
- پ) سرخرگی که خون را از کلافک خارج می‌کند؟
- ت) رگی که خون را از کلیه خارج می‌کند؟
- ث) شبکه مویرگی که به سیاهرگ وصل نمی‌شود؟

## « پاسخ »

- |           |                    |           |
|-----------|--------------------|-----------|
| پ) واپران | ب) آوران           | الف) ۱    |
|           | ث) شبکه مویرگی اول | ت) سیاهرگ |

۷۴- الف) کپسول بومن را تعریف کنید.

ب) بخشی از نفرون یا گردیزه که متصل به مجرای جمع کننده ادرار است، نام ببرید.

## « پاسخ »

- الف) ابتدای گردیزه که قیف‌مانند است، کپسول بومن نام دارد.
- ب) لوله پیچ خورده دور

۷۵- در ارتباط با گردیزه به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) تعداد گردیزه‌ها در هر کلیه:

ب) اجزای تشکیل‌دهنده گردیزه:

## » پاسخ «

الف) حدود یک میلیون

ب) کپسول بومن - لوله پیچ خورده نزدیک - لوله پیچ خورده دور - قوس هنله (U شکل)

۷۶- نحوه قرار گرفتن هرم‌های کلیه را بیان کنید.

## » پاسخ «

قاعده هرم‌ها به سمت بخش قشری و رأس آن‌ها به سمت لگنچه است.

۷۷- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

پ) لگنچه

ب) لپ کلیه

## » پاسخ «

الف) ساختارهای هرمی‌شکل در بخش مرکزی کلیه

ب) هرم و ناحیه قشری مربوط به آن را یک لپ کلیه می‌نامند.

پ) لگنچه ساختاری شبیه قیف است که ادرار تولیدشده به آن وارد و به میزانی هدایت می‌شود.

۷۸- درست و نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

الف) کلیه راست نسبت به کلیه چپ پایین‌تر است و در نتیجه میزانی آن کوتاه‌تر است.

ب) کلیه توسط یک نوع بافت پیوندی احاطه شده است.

پ) در فاصله بین هرم‌ها، ستون کلیه است که انشعاباتی از بخش قشری‌اند.

## » پاسخ «

پ) صحیح

ب) غلط

الف) صحیح

۷۹- درست و نادرست بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

الف) یاخته‌های پادار (پودوسيت) در برخی جاها با مویرگ، غشای پایه مشترک دارد.

ب) بخشی از صفاق اطراف کلیه‌ها است ولی به کپسول کلیه ربطی ندارد.

پ) بخشی از کلیه توسط دنده‌ها محافظت می‌شود.

ت) لوله پیچ خورده دور و نزدیک قطر متفاوت دارند.

## » پاسخ «

ت) غلط

پ) صحیح

ب) صحیح

الف) صحیح

۸۰-الف) سه بخشی که در برش طولی کلیه (ساختار درونی کلیه) به ترتیب از پرون به داخل دیده می شود، نام ببرید.  
ب) هرم‌های کلیه و لپ کلیه در کدام ساختار کلیه دیده می شوند؟

(( بِسْم ))

- الف) بخش قشری - مرکزی - لگنچه  
ب) ساختار درونی

۸۱- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

- الف) جنس کپسول کلیه:  
ب) نقش چربی های اطراف  
ب) عوارض افتادگی کلیه

« حُسْنٌ »

- الف) از جنس بافت پیوندی  
ب) محافظت از کلیه در برابر ضربه و حفظ موقعیت کلیه  
پ) خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادار از کلیه و در نهایت نارسایی کلیه

۸۲-الف) سه راه حفاظت از کلیه را نام ببرید.

- ب) عوارض تحلیل بیش از حد چربی‌ها در افرادی که برنامه کاهش وزن سریع و شدید دارند، چیست؟

۱۰

- الف) دنددها - کپسول کلیه - چربی‌های اطراف کلیه  
ب) ممکن است سبب افتادگی کلیه و تاخور دگی میزانی شود.

<sup>۸۳</sup>- به سؤالات زیر در مورد کلیه‌ها پاسخ کوتاه دهید.

- الف) شکل:  
ب) تعداد و موقعیت قرارگیری:  
ب) دلایل یا نسبت بین موقوعات کلیه، است نسبت به حب:

« ملک »

- الف) لوبيایی شکل اند.  
ب) تعداد دو عدد در طرفین ستون مهره‌ها و محوطه شکمی  
پ) به دلیل موقعیت قرارگیری و شکل کبد

۸۴- نوع تنفس را در موجودات زیر بنویسید.

- الف) كرم خاكي      ب) ماهي      ج) ملخ

پاسخ (۱)

- الف) تنفس پوستی      ب) تنفس آبشنشی      ج) تنفس نایدیسی

-۸۵- کدام موادی که در ستون الف نوشته شده است در مایعات ستون ب وجود دارد؟

ستون ب

ستون الف

خون ورودی به کلیه

پروتئین

خون خروجی از کلیه

گلوکز

خونی که به کپسول بومن تراوش می‌شود

اوره

ادراری که کلیه را ترک می‌کند

آب

## » پاسخ «

پروتئین ← در خون ورودی به کلیه و خون خروجی از کلیه

گلوکز ← در خون ورودی به کلیه، خونی که به کپسول بومن تراوش می‌شود و خونی که از کلیه خارج می‌شود.

اوره و آب در هر چهار مورد ستون ب وجود دارد.